

## Cours

- Définition d'un jeu. Jeu d'accessibilité. Stratégie, stratégie gagnante.
- Calcul des attracteurs. Définition des  $A_i^j$  dans l'algorithme du calcul des attracteurs.
- Algorithme min-max, élagage  $\alpha/\beta$ , verison avec heuristique.
- Algorithme  $A^*$
- Zermelo (HP)

## Petites questions

- Soit un jeu  $G = (V, E)$  avec  $V = \mathbb{N}$  et telle que les arêtes orienté sont toutes de la forme  $(x, y)$  avec  $y < x$ . On suppose de plus que  $\forall x \in V, \deg_+ v = 0 \Rightarrow v \in F_1 \cup F_2$ . Montrer que pour chaque état du jeu, un des deux joueurs possède toujours une stratégie gagnante.

## Exercices à ajouter:

- Devine le nombre de points fixes, Putnam 2023

# Jeu de nim généralisé<sup>1</sup>

Soit  $A \subseteq \mathbb{N}^*$  fini avec  $1 \in A$ . On considère un jeu à deux joueurs où  $N > 0$  objets sont disposés sur une table, et chaque joueur doit à tour de rôle retirer  $t \in A$  objets de la table (s'il peut). Le joueur qui retire le dernier objet perd.

On appellera (A)lice le joueur qui commence et (B)ob le deuxième joueur.

1. Montrer qu'il existe toujours une stratégie gagnante depuis l'état initial pour l'un ou l'autre des joueurs.
2. Pour les valeurs de  $A$  suivantes, pour quels  $N$  Alice possède-t'elle une stratégie gagnante ?
  - $A = \mathbb{N}$
  - $A = \{1\}$
  - $A = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{N}\}$
3. Si  $\max(A) \leq N$ , proposer un algorithme qui décide si Alice possède une stratégie gagnante pour un  $N$  donné.
4. Pour  $A = \mathbb{P}$  l'ensemble des nombres premiers, pour quelles valeurs de  $N$  Alice possède t'elle une stratégie gagnante ? Et pour  $A = \{2^i : i \in \mathbb{N}\}$  l'ensemble des puissances de 2 ? Et pour  $\{1, \dots, p\}$  ?
5. Montrer qu'il existe un ensemble  $A$  tel que si on note  $S_A$  l'ensemble des  $N$  tel que Alice possède une stratégie gagnante, alors il n'existe pas  $N_0, T > 0, \forall n > N_0, n \in S_A \iff n + T \in S_A$ .

---

<sup>1</sup>Sujet original !

## Géographie dans les hypercubes<sup>2</sup>

Soit  $\Sigma = \{a, b, c\}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ . Alice et Bob joue au jeu suivant: à tour de role, iels choisissent un mot dans  $\Sigma^n$  qui n'a pas déjà été choisi avant, et tel que il ne diffère que d'une lettre avec le dernier mot choisi. Alice choisi un mot quelquonque au début. Le premier joueur ne pouvant pas jouer perd. On cherche à établir une stratégie gagnante.

On pose  $w_a = \underbrace{a\dots a}_{n \text{ fois}}$

1. Dessiner le graphe des états pour  $n = 1$  et  $n = 2$ . Qui gagne ?
2. Montrer qu'un joueur  $X$  possède une stratégie gagnante ssi et seulement il en possède une pour le jeu ou Alice commence par le mot  $w_a$ .

On supposera maintenant sans perte de généralité que le premier coup d'Alice est  $a\dots a$ . On pose  $G_n = (V_n, E_n)$  le graphe définit par  $V_n = \Sigma^n$  et  $(u, v) \in E$  si  $u$  et  $v$  ne diffèrent que d'une lettre.

3. Montrer par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}^*$  que  $G_n - w_a$  possède une couplage parfaits
4. En déduire que Alice possède une stratégie gagnante.
5. Généraliser pour  $\Sigma = \{a, b, c, d\}$  et puis après pour tout alphabet fini non vide  $\Sigma$

---

<sup>2</sup>Le putnam de 2025

## Géographie<sup>3</sup>

Soit  $G = (V, E)$  un graphe, on définit le jeu à deux joueurs (A)lice et (B)ob tel que à tour de rôle, chaque joueur doit marquer un sommet non déjà marqué qui soit un voisin du dernier sommet marqué. Le premier joueur qui ne peut plus marquer de sommet perd. Le premier joueur (Alice) peut choisir ou commencer.

2. On considère  $C_n$  le cycle de longueur  $n$ . Pour quel  $n \in \mathbb{N}$  est-ce que Alice a une stratégie gagnante sur  $C_n$  ?
3. Montrer que si le graphe possède un couplage parfait, alors Bob possède une stratégie gagnante. La réciproque est-elle vraie ?
4. Proposer un algorithme dans le cas où  $G$  est un arbre pour savoir qui possède une stratégie gagnante.
5. On considère le cas où  $V \subseteq \mathbb{N}^2$  et  $\forall((x, y), (x', y')) \in E, |x - x'| + |y - y'| = 1$  avec  $G$  connexe. A quelle condition sur  $|V|$  est-ce que Alice possède une stratégie gagnante ?

---

<sup>3</sup>Marathon de math de Paris-Orsay 2021

## Jeu de Shannon

On considère un jeu avec un graphe  $G = (V, E)$  non orienté qui peut posséder plusieurs arêtes entre deux sommets. Deux joueurs (A)lice et (B)ob, où Alice commence, choisissent alternativement une arête de  $G$  non encore choisie. Si, à un moment de la partie, les arêtes choisies par Bob forment un arbre couvrant de  $G$  alors Bob gagne. Sinon, Alice gagne.

Pour  $\mathcal{P}$  une partition de  $V$ , on note  $|\mathcal{P}|$  le nombre de parties et  $\|\mathcal{P}\|$  le nombre d'arêtes de  $G$  dont les deux extrémités sont dans des ensembles différents de  $\mathcal{P}$ .

**Question 1** Soit  $T_1, T_2$  deux arbres couvrants de  $G$  et  $e_1$  une arête de  $T_1$ . Montrer qu'il existe  $e$  une arête de  $T_2$  tel que  $T_1 - e_1 + e_2$  soit un arbre couvrant de  $G$

**Question 2** On suppose qu'il existe une partition  $\mathcal{P}$  de  $V$  telle que  $\|\mathcal{P}\| < 2(|\mathcal{P}| - 1)$ . Montrer que Alice possède une stratégie gagnante.

**Question 3** Soit  $T$  un arbre couvrant de  $G$  et  $e$  une arête de  $T$ . Soient  $T'$  et  $G'$  obtenus en contractant  $e$  dans  $T$  et  $G$ , c'est-à-dire en supprimant  $e$  et identifiant ses extrémités. Montrer que  $T'$  est un arbre couvrant de  $G'$ .

**Théorème** On admet le théorème de Tutte:  $G$  possède  $k$  arbres couvrants disjoints si et seulement si pour tout partition  $P$  de  $V$ ,  $\|P\| \geq k(|P| - 1)$

**Question 4** Montrer que Bob a une stratégie gagnante si et seulement si  $G$  possède deux arbres couvrants disjoints.

## Parité du nombre de points fixes<sup>4</sup>

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Alice et Bob jouent au jeu suivant: Bob choisi “pair” ou impair, puis à tour de role en commençant par Alice, iels choisissent un nombre entre 1 et  $n$  qui n’ont pas déjà été choisi. Bob gagne si, une fois que tous les entiers ont été choisi, le cardinal  $|\{1 \leq k \leq n \mid k \text{ choisit au } k - \text{ème tour de jeu}\}|$  correspond à la parité qu’il a choisi.

Pour quels  $n$  est-ce que Bob à une stratégie gagnante ?

**Exemple de partie pour  $n = 3$  :** Bob choisit “impair” et

- Si Alice choisit 1, Bob choisit 2 et alicé doit choisir 3. L’ensemble est  $\{1, 2, 3\}$  et Bob gagne.
- Si Alice choisit 2, Bob choisit 1 et alicé doit choisir 3. L’ensemble est  $\{3\}$  et bob gagne
- Si Alice choisit 3, Bob choisit 2 et alicé doit choisir 1. L’ensemble est  $\{2\}$  donc Bob gagne.

Donc Bob a une stratégie gagnante pour  $n = 3$ .

---

<sup>4</sup>Putnam 2023

## Jeu du sous-mot<sup>5</sup>

Soit  $\Sigma$  un alphabet, on considère le jeu à deux joueurs (dénomé (A)lice et (B)ob) du sous-mot suivant: a tour de role, chaque joueur dit un mot  $w \in \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$  qui ne contient aucun des mots déjà dit en sous-mot. Le premier joueur qui ne peut plus dire de mot perd. Par exemple, sur  $\Sigma = \{a, b\}$ , la partie pourrait être  $abb \rightarrow bbbb \rightarrow aab \rightarrow a \rightarrow bbb \rightarrow bb \rightarrow b$  et Alice perd (Alice étant la joueuse qui commence).

On admettra que ce jeu termine toujours (cette propriété viens du lemme d'higman).

**Question 1** On admet pour l'instant que Bob possède une stratégie gagnante pour  $|\Sigma|$  pair. Montrer que Alice possède une stratégie gagnante pour  $|\Sigma|$  impair.

**Question 2** Pour  $\Sigma = \{a, b\}$ , on définit  $\bar{a} := b$  et  $\bar{b} := a$ , puis  $\overline{w_1 \dots w_n} = \bar{w}_1 \dots \bar{w}_n$ . Montrer que Bob possède une stratégie gagnante pour  $\Sigma = \{a, b\}$ .

**Question 3** En généralisant la question précédente, montrer que Bob possède une stratégie gagnante pour  $|\Sigma|$  pair.

**Question 4** (\* \*) Montrer que le jeu termine toujours, autrement dit que si  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\Sigma^*)^{\mathbb{N}}$  est une suite infinie de mots, alors il existe  $i < j$  tel que  $w_i$  soit un sous-mot de  $w_j$ .

---

<sup>5</sup>Sujet original !

